DEPAKINE® -- *GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska*
valproinska kiselina - N03AG01

ANTIEPILEPTICI

N03AG derivati masnih kiselina
Z 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL;
liobočica sa rastvaračem, 4x4mL
5 godina, na temperaturi ispod 30° C

Doziranje: povremeno lečenje epilepsije kada primena oralnog valproata nije moguća: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2.5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre).

Paralelni lekovi: Eftil®

DEPAKINE® CHRONO -- *SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska*
valproinska kiselina, natrijum-valproat - N03AG01

ANTIEPILEPTICI

N03AG derivati masnih kiselina
R 1084815 tableta sa produženim oslobađanjem; 300mg; fiola, 1x30tabl.
3 godine; podeljene tablete 24 sata, bez posebnih naznaka

R 1084816 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg;
fiola, 1x30tabl.
3 godine; podeljene tablete 24 sata, bez posebnih naznaka

Doziranje: terapija generalizovanih, parcijalnih i drugih oblika epileptičnih napada:
početna doza za većinu bolesnika (60-100kg) je 10-15mg/kg dnevno, odnosno 2-5 tabl. (300mg) ili 1-3 tabl. (500mg). Doza se mora titrirati do optimalnog nivoa i podeliti na 1-2 dnevne doze.
Doza kod odraslih je, po pravilu, između 20-30mg/kg dnevno, odnosno 4-10 tabl. po 300mg ili 2-6 tabl. po 500mg ako je telesna masa bolesnika između 60-100 kg. Ukoliko se ne može postići
kontrola epi napada, doza se može povećati. Bolesnik koji dobija dnevne doze veće od 50mg/kg moraju da bude pod posebnim nadzorom. Najčešća doza kod dece je oko 30mg/kg dnevno.
Terapija i prevencija akutne manije kod bolesnika sa bipolarnim poremećajem
(odrasli): preporučena inicijalna doza u terapiji akutne manije iznosi 20mg/kg/dan; doza se može prilagoditi prema individualnom kliničkom odgovoru, maks. dnevna doza ne sme biti veća od 3000mg; preporučena doza održavanja kod bipolarnog poremećaja je 1000-2000mg/dan. Profilaktičke doze u prevenciji akutne manije su individualne, u skladu sa najnižom efikasnom dozom, s tim što ciljne koncentracije leka u plazmi treba da budu 50-125mcg/mL.

Paralelni lekovi: Depakine® Chronosphere

DEPAKINE® CHRONOSPHERE -- *SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska*
valproinska kiselina, natrijum-valproat - N03AG01

ANTIEPILEPTICI

N03AG derivati masnih kiselina
R 2084812 granule sa produženim oslobađanjem; 250mg;kesica, 30x1kom
2 godine, na temperaturi od 25 °C
R 2084813 granule sa produženim oslobađanjem; 500mg;kesica, 30x1kom
2 godine, na temperaturi do 25°C

R 2084814 granule sa produženim oslobađanjem; 750mg;kesica, 30x1kom
2 godine, na temperaturi do 25°C
R 2084811 granule sa produženim oslobađanjem; 1000mg;kesica, 30x1kom
2 godine, na temperaturi do 25°C
R 2084810 granule sa produženim oslobađanjem; 100mg;kesica, 30x1kom
2 godine, na temperaturi do 25° C

Doziranje: terapija generalizovanih, parcijalnih i drugih oblika epileptičnih napada:
odrasli terapiju započeti sa 600mg/dan i titrirati dozu svaka 3 dana za 200mg do postizanja kontrole napada (u okviru raspona doza od 1000-2000mg/dan; deca < 20kg telesne mase inicijalna doza od 20mg/kg/dan postupno se povećava do postizanja kontrole napada (u okviru raspona doza od 20-30mg/kg/dan); deca > 20kg telesne mase inicijalna doza od 400mg/dan postupno se povećava (ukoliko je potrebno) do potpune kontrole napada (u okviru raspona doza od 20-30mg/kg/dan. Doziranje ovog leka u terapiji i prevenciji akutne manije sprovodi se pod nadzorom iskusnog specijaliste za lečenje bipolarnih poremećaja.

Paralelni lekovi: Depakine® Chrono

Joomla SEO powered by JoomSEF